



Plus de 100 Spécialités pharmaceutiques utilisées ou en cours d'essais

Les phases de développement indiquées sont évolutives

Spécialités en test  
Nouveautés pour Parkinson

SYMPTOMES	Objectif	Composition (ou labo si recherche)	Particularités	Disponibilité (Fr)	Observations
<b>Symptômes moteurs</b>					
	<b>Remplacement de la dopamine</b>				
		Sinemet Levodopa Carbidopa	Plutôt pays anglo saxons	oui	Dyskinésies à long terme
		ND0612 Pompe à Levodopa	Fonctionne comme la pompe à apomorphine	Phase 3	pour ces médicaments à base
		Parcopa (2015) Levodopa Carbidopa soluble	Sublinguale (action rapide)	Phase 3	de levodopa
		Duodopa (2015) Gel de Levodopa-Carbidopa	Pour perfusion duodénale	oui	
		Imbrija (2018) Levodopa (Lab Acorda)	Poudre à inhaler (action rapide)	Oui USA	
		Rytary (2019) Levodopa Carbidopa en capsule	Formulation à action double durée	en cours d'approbation	
		Modopar Levodopa Benzerazide	Plutôt Europe	oui	
		Stalevo (partiel) Levodopa Carbidopa + Entacapone	Souvent donné comme tritement principal	oui	Dosage délicat
		Pilule accordéon Levodopa (Lab Intec Pharma - Israël)	Absorsion prolongée vers l'intestin	Phase 3	
	<b>Antagoniste des récepteurs d'adénoside</b>				
		Nourianz (2019) Istradéflylline		trop récent	
		Amantadine, Mantadix Amantadine		oui	Troubles comportemental et vertiges
		Symmetrel Amantadine	Libération immédiate	non	
		Osmolex ER (2018) Amandatine	Forme LP de Symmetrel	non	
		Gogovri (2018) Amantadine	Libération prolongée	En phase 3	
	<b>Anticholinergiques</b>				
		Artane Trihexyphénide chlorhydrate		oui	
		Cogentine Benztropine mesylate	Anti tremblement, Dystonie , Bave ...	on	
	<b>Inhibiteurs de la catéchol-O-méthyltransférase (COMT)</b>				
		Comtan Entacapone		oui	Risque hépatique
		Tasmar Tolcapone	Empêche la décomposition de la levodopa.	oui	Trouble comportemental
		Stalevo (partiel) Levodopa Carbodopa Entacapone		oui	Trouble comportemental
		Ongentys Opicapone	Associé à de la Levodopa , empêche sa dégradation	HAS: pas d'avantage par rapport à entacapone	
	<b>Inhibiteur de la décarboxylase</b>				
		Lodosyn Carpidopa	complément nécessaire de la léodopa	oui-non	Uniquement en milieu hospitalier
	<b>Agoniste de la dopamine</b>				
		Mirapex Pramipexole		arrêt de vente	Troubles compulsifs
		Requip Ropinirole		oui	Troubles compulsifs possibles
		Neupro Rotigotine Transdermique	Timbre Transdermique	oui	
		Apokynon Apomorphine	Stylo injecteur ou pompe injection sous/cutanée	oui	
		Sunovion Apomorphine	Capsule sub linguale action rapide	oui USA	Approbation FDA en cours

SYMPTOMES	Objectif	Composition (ou labo si recherche)	Particularités	Disponibilité (Fr)	Observations
	<b>Inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) B</b>		Diminution des dose de dopaminergique		
			surtout après long traitement dopaminergique		
	Azilect	Rasagiline	Comprimé	oui	
	Eldepryl, Deprenyl	Seleginine chlorhydrate	Comprimé	oui	Risque hépatique et Troublecomportemental.
	<b>Emsam (2020)</b>	Seleginine	Patch transdermique	<b>Visa temporaire</b>	Eviter la conduite
	<b>Zelapar (2019)</b>	Seleginine lyophilisate	Tablettes lyophilisée. Classe des amphétamines	oui USA	
	<b>Xadago (2017)</b>	Salfinamide	Fluctuation . Associer à un antiparkinsonien	<b>Refus HAS</b>	Risque hépatique, rapport efficacité
<b>Repositionnement de médicament utilisés pour d'autres pathologies</b>					<b>Recherche en cours</b>
	<b>Inosine</b>	Antioxydant .Ancien traitemenmt de la vision	Espoir de ralentissement de la MP	oui	Phase 2I
	<b>Isradipine</b>	Anti Hypertention	Peu de MP chez les patients sous traitement de ce médoc	<b>oui</b>	<b>Phase 3 hélas peu concluante fin 2019</b>
	<b>Felodipine</b>	Vaso dilateur calcique pour l'hypertension	Ralentir la formation de protéines dans la MP	oui	En Phase 2 encourageante
	<b>Nilotinib</b>	Un anti-cancéreux (leucémie myéloïde)	Réduction des protéines c-Abl dans le cerveau des MP	non	En Phase 2 encourageante
	<b>Exenatide</b>	Anti diabétique	Amélioration des symtômes moteurs	oui	En phase 3 encourageante
	<b>Ambroxol</b>	Sirop contre la toux	Elimination des déchets protéiques dans le cerveau	oui	En phase 2
	<b>Doxycycline</b>	Antibiotique antiactérien et anti inflammatoire	Réduit la toxicité de l'alpha synucléine	oui	En phase 2
	<b>Chélate de Fer</b>	Eliminationde l'exès de fer dans le cerveau	Actuellement saignées ou traitement thalassémique	oui	En phase 2
	<b>Etoprazine</b>	Ancien traitement de l'agressivité	Efficacité démontrée sur les dyskinésie	oui	En phase 2
<b>Spécialités en développement</b>					
<b>Modification de la maladie</b>					
<b>Réduction de l'alpha Alpha -synucléine (AS)</b>					
		BIBB054	Anticorps de biogène	Réduire la propagation de l'AS	Phase 2
		NPT088	Proclara® . (Ex Neurophage)	Empêche l'agglomération de l'AS	Phase 1
		RO7046015	famille des anticorps. Prothena® (Lab Roche)	Empêche propagarion de l'AS	Phase 2
		Prasinezumab.	(Lab Roche) Etude PASADENA	Réduction de l'AS.	Phase 3 en 2020
<b>Traitement de la mutation du gène GBA</b>					
		GZ/SAR402671	Genzyme (Lab Sanofi)	Réduit la production de lipides avec les mutations GBA	Phase 1
		LTI-291	( Lab Lyosomal Therapeutics)	Compenser le dysfonctionnement de la mutation GBA	Phase 1
<b>Traitement de la mutation du gène LRRK2</b>					
		DNL201	(Lab Denaly)	Réduire l'activité du gne LRRK2	Phase 1
<b>Amélioration des facteurs neurotropiques</b>					
		GNDF	(Lab Genesis)	Protection des cellules dopaminergiques	Phase 2
		CNDF	(Lab Herantis)	Protection des cellules dopaminergiques	Phase2
<b>Approche médicamenteuse sans dopamine</b>					
		PXT002331	Foliglurax (Lab Preston Therapeutics)	Action sur le glutamate et autres chimie du cerveau	Phase 2
<b>Thérapie génique</b>					
		AAV2-hAADC	(Lab Voyager)	Augmenter la production de protéines manquantes	Phase 1
<b>Symtômes moteurs</b>					
<b>Dyskinésie</b>					
		ADX48621-201	<b>Dipraglurant (Lab Addex Pharma)</b>	Bloque les effet du gutamate chimique du cerveau	Phase 2
<b>Symptômes non moteurs</b>					
<b>Constipation</b>					
		RQ10	(Lab Zaqualia Pharma, Pfizer)	Action sur sérotonine pour accélérer la vidange gastrique	Phase 1

SYMPTOMES	Objectif	Composition (ou labo si recherche)	Particularités	Disponibilité (Fr)	Observations
<b>Sympômes non moteurs</b>					
	<b>Constipation</b>				
	<i>Laxatif</i>				
		Metamucil Psyllium (poudre +- additif parfumé)	Laxatif mucilagineux et hypocholestérolémiants	oui	Pour constipation modérée
		Colace Docusate	Adoucisseur de selles	oui	Pour selles dures
		Miralax Polyéthylène glycol	Laxatifs stimulants à ne pas utiliser en continu	oui	
		Ducolax DBisacodyl		oui	
		Senokot Séné (graines)		oui	
		Movicol Macrogol		oui	
	<b>Lavement</b>	Avec accessoires stériles	En cas d'obstruction et sous conseil médical		
	<b>Constipations sévère</b>				
		Linness, Constella Linaclotide	Surtout pour "Colon irritable" avec constipation	oui	Uniquement avec prescription médicale
		Amitiza Lubiprostone	Constipation chronique	oui	
		Trulance (2017) Plecanatide	Constipation chronique	oui USA	
	<b>Démence Parkinsonienne (PDD)</b>	(La PDD souvent liée à l'accroissement des corps de Lewy, est sans rapport avec la démence Alzheimer )			
		Exelon Rivastigmine	Pilule, liquide ou patch. PDD légère	<b>N'est plus remboursé en France pour la maladie d'Alzheimer</b>	
		Aricept Donepezil	Anticholinestérasiques- PDD légères	oui	Souvent donné pour Alzheimer
		Razadine Galantamine	Anticholinestérasiques- PDD légères	non	
		LY315.4207 Secret du Labo	Démence à corps de Lewy	phase 2	
	<b>Marche - Equilibre et chutes</b>				
		Aricept Donopzil	Anticholinestérasiques- Réduit les chutes	en phase 2 pour chutes	
		Champix Varénciline	Anticholinestérasiques- Agoniste nicotinique	en phase 2 pour chutes	
	<b>Dépression et anxiété</b>				
	<i>Antidépresseur</i>				
		Deroxat, Paxil Paroxétine	Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine ou noradrénaline (IRS ou IRSN)	oui	Dépression majeure , TOC
		Effexor XR Venlafaxine		oui	Ne pas utiliser avec les IMAO
	<i>Anti anxiété</i>				
		Témesta,Ativan Lorazepam	Anxiété sévère	oui	Maximum 8 semaines de traitement
		lexomil, Valium,Xanax Alprazolam, benzodiazépines	Risque accru de démence	oui	Sevrage nécessaire
		Kava (pour ceux qui vont dans les îles)	Décotion de racines fermentées (Kavalactone)	oui	" Xanax naturel" !!!
		Buspar (2019) Buspirone HLC	Pourrait remplacer les benzodiazépines	en test	Incompatible avec les MAO
	<b>Hypersialorrhée, Bave</b>				
		Xeomin (2016) Incobotulinumtoxin A	Agit par blocage des galdes salivaire	oui en test	A faire en milieu hospitalier
		Myobloc (2016) rimabotulinumtoxin B		oui en test	
		Artane Trihexyphénidyle	Effet secondaire : sécheresse de la bouche	oui	Prudence : constipation
		Robinul Glycopyrrolate	Diminue les sécrétion comme a salive	oui	Prudence

SYMPTOMES	Objectif	Composition (ou labo si recherche)	Particularités	Disponibilité (Fr)	Observations	
<b>Sympômes non moteurs</b>						
	<b>Fatigue</b>					
	<b>Stimulants</b>					
		Ritaline	Méthylphénidate	Souvent donné aux enfants manquant d'attention	oui	Amphétamine !!!
	<b>Emulateur d'éveil</b>					
		Provigil	Modafinil	Contre les effets secondaire des médicaments et les difficultés d'éveil dans la journée	oui	Anti anxieux et nauséux
		Nugivil	Armodafinil			
	<b>Autres</b>					
		Amantadine, Rasagiline, Sélégiline	déjà cités	Sdiminution de la fatigue rapportée par malades	oui	
	<b>Hypotension artérielle (orthostratique)</b>			Si les changement alimentaire et compotementaux sont inefficaces...		
		Northera	Doxidropa	A réserver vraiment si les effet sont impossibles à éviter autrement	oui	Suivi médical nécessaire
		Florinerf	Fludrocortisone		oui	
		Pro Amatine	Midodrine		oui	
	<b>Douleur</b>			<b>Sujet très important et actuellement mal géré</b>		
		<b>Botox (2019)</b>	Toxine botulique (des plasticiens)	Crampes musculaires des dystonies	oui	En milieu hospitalier
		Ibuprofène, Paracétamol...	Les anti inflammatoires classiques	Respecter la posologie	oui	
		Tylenol	Acétaminophène Codéine	Puissant anti douleur à manipuler avec précaution	oui	Décommandé aux astmatiques
		Lamaline	Opium Paracétamol	Un peu trop à la mode	oui	Attention aux addictions
		<b>Sativex, Marinol, Epidiolex(2019)</b>	Cannabis médical THC, CBD	Peut-être une solution aux névralgies de la MP	<a href="#">oui en test</a>	
	<b>Psychoses (hallucinations ou délires)</b>					
		Nuplazid	Pimavansérine	Action sur la sérotonine du cerveau	oui	Utile pour l'insomnie et le stress
		Clozaril	Clozapine	Traitement es psychose sévères	oui	Risques d'aggravation de la MP
		Seroquel	Quétiapine	Antisépresseur et régulateur de l'humeur	oui	Suivi sanguin nécessaire
		SEP-363856	(Lab Sunovion et PsychoGenics)	Agoniste des récepteurs TAAR1 et sérotonine 1A	Phase 2	
	<b>Problèmes sexuels</b>					
		Viagra	Sildenafil	Les "jeunes" parkinsonniens peuvent rencontrer des difficultés avec les traitemst. Privilégier les oestrogènes et les hormones pour la lubrification	oui	Effets cardiaques possibles
		Cialis	Tadalafil		oui	
		Levitra	Vardenafil		oui	
	<b>Insomnies</b>					
	<b>Sédatifs</b>					
		Lunesta, Zopiclone	Eszopiclone	Tous ces hypnotiques ne doivent être utilisés que pour des troubles sévères du sommeil	oui	Traitement de courte durée . ordonnance courte obligatoire
		Imovane, Stilnox; Ambien	Zolpidem		oui	
		Silenor, Desyrel	Doxépine, Trazodone		oui	
		<b>Zaleplon (2019), Sonata (2019)</b>	Zaleplon		oui	
	<b>Problèmes urinaires</b>					
		<b>Botox</b>	Toxine botulique (des plasticiens)	Injection dans les musles de la vessie	oui	En milieu hospitalier
		Ditropan	Oxybutinine	Diminue les besoins fréquents d'uriner	oui	
		Detrol	Toltérodine	A réserver aux personnes âgées	oui	Induit constipation et somnolence
		Mirabetric	Mirabegron	Efficacité modérée	<b>Déconseillé par la HAS</b>	Service insuffisant
	<b>Agueusie Anosmie</b>		Perte du goût , de l'odorat			
			<b>RIEN</b>	Rééducation de longue durée envisageable		